



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 1 von 7

Diese Liste wurde nach besten Wissen und Sorgfalt erstellt und überprüft. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und es kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und Apotheker.

Name	Gruppe	Dosierung	Einnahme	Lagerung	Nebenwirkungen
Aptivus®(Tipranavir, TP V)	PI	2x tägl. 500 mg (2 Kaps.) geboostert mit 2 x tägl. 2 Kps. RTV (200 mg)	Zu den Mahlzeiten	2-8 °C, nach dem Öffnen der Packung bei 25°C 60 Tage haltbar	Hautausschlag, besonders in Kombination mit Ethinylestradiol• Blutbildveränderungen• Leberfunktionsstörungen• Übelkeit, Durchfall• Kopfschmerzen• Schlafstörungen
Atripla®(Efavirenz, EFV + Emtricitabin, FTC + Tenofovir TDF)	NNRTI/ NRTI	1x tägl. 1 Tabl.	Nüchtern, vor dem Schlafengehen	Flasche dicht verschlossen ; vor Feuchtigkeit geschützt	• Übelkeit, Erbrechen, Durchfall • Hautausschläge • Hitzewallungen, Müdigkeit, Fieber • ZNS-Symptome: abnorme Träume, Depressionen
Celsentri® (Maraviroc, MCV)	CCR5-Inhibitor	2x tägl. 150mg 2x tägl. 300mg (Standard) 2x tägl. 600 mg	Nüchtern oder zu den Mahlzeiten	RT	• Kopfschmerzen, Benommenheit• Übelkeit, Flatulenz• Müdigkeit, Bauchschmerzen • Konjunktivitis
Combivir®(Zidovudin, AZT + Lamivudin, 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl.(300 mg AZT + 150 mg 3TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	• Blutbildveränderungen• Kopfschmerzen• Übelkeit
Crixivan®(Indinavir, IDV)	PI	2 x tägl. 2 Kps. (800 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Nüchtern bis 1 h vor den Mahlzeiten oder mit leichter, fettfreier Mahlzeit; viel Flüssigkeit: 2-3 l	RT	• Nierensteine• Magen-Darm-Beschwerden• Kopfschmerz• Hyperglykämie• selten aber schwerwiegend Blutbildveränderung• Hämophile:



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 2 von 7

		Ungeboostert 2 Kps. (800 mg) alle 8 Std.	pro Tag		erhöhte Blutungsneigung
Edurant® (Rilpivirin, RLP)	NNRTI	1 x tägl. 1 Tabl.	Zu einer Mahlzeit mit mindestens 533 kcal	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Blutbildveränderungen • Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schlafstörungen • Übelkeit • Leberwertveränderungen • Ausschläge
Emtriva® (Emtricitabin, FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (200 mg)	Zu den Mahlzeiten oder Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Blutbildveränderungen • Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Insomnie • Magen-Darm-Beschwerden • Leberwertveränderungen • Ausschläge, allergische Hautreaktionen
Epivir® (Lamivudin, 3TC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (150mg) oder 1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Blutbildveränderungen • Kopfschmerzen • Übelkeit • Schlafstörungen • Lipodystrophie
Eviplera® (Rilpivirin, RLP + Emtricitabin, FTC + Tenovofir, TDF)	NNRTI/ NRTI	1 x tägl. 1 Tabl.	Zu einer Mahlzeit mit mindestens 533 kcal	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Blutbildveränderungen • Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schlafstörungen • Übelkeit • Leberwertveränderungen • Ausschläge
Invirase500® (Saquinavir, SQV)	PI	2 x tägl. 2 Kps. (1000 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Zu den Mahlzeiten oder bis 2 h nach der Mahlzeit	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Magen-Darm-Beschwerden • Ausschlag • Neuropathie • selten aber schwerwiegend Blutbildveränderung • Steven-Johnsons-Syndrom • Hämophile:



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 3 von 7

					erhöhte Blutungsneigung
Intelence® 100 mg u. 200 mg (Etravirin, T125)	NNRTI	2 x tägl. 1 Tabletten (200 mg) oder 2 x tägl. 2 Tabletten (100mg)	Nach den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Kopfschmerzen • Hautausschlag ("Rash") • Diarrhoe
Isentress®(Raltegravir, RAL)	Integrase Inhibitor	2 x tägl. 1 FTA (400mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> •Schwindel • Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung • Hauterkrankungen •Müdigkeit, Schwächegefühl • Verdacht auf erhöhtes Krebsrisiko
Kaletra®(Lopinavir, LPV + Ritonavir, RTV)	PI	2 x tägl. 2 FTA (200 mg Lopinavir + 50 mg Ritonavir) oder 1 x 4 FTA tägl. bei geeignetem Resistenzprofil	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Durchfall, Übelkeit • Hämophile: erhöhte Blutungsneigung • Blutbildveränderungen • Kopfschmerz
Kivexa®(Abacavir, ABC + Lamivudin, 3TC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl.(600 mg ABC + 300 mg 3TC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Überempfindlichkeit gegenüber Ziagen®, Hautausschlag • Magen-Darm-Beschwerden • Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelbeschwerden • Laktatazidose • Fettumverteilung
Norvir® (Ritonavir, RTV)	PI	In Kombinationstherapie mit anderen PI's 1-2x tägl. 100 - 300 mg (1-3 Tbl.)	Zu den Mahlzeiten	Tabletten: RT	<ul style="list-style-type: none"> • Durchfall, Übelkeit • Ausschlag • Geschmacksstörungen • Hämophile: erhöhte Blutungsneigung



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 4 von 7

			Zu den Mahlzeiten, Therapie einschleichend beginnen 1. Tag 2 x 3Kps. (300 mg) 2.-3. Tag 2 x 4 Kps. (400 mg)4. Tag 2 x 5 Kps. (500 mg)dann 2 x 6 Kps. (600 mg)	Norvir® Kapseln: 2-8 °C, max. 7 Tage bei RT	Durchfall, Übelkeit• Ausschlag• Geschmacksstörungen• Hämophile: erhöhte Blutungsneigung
Prezista® (Darunavir,DRV)	PI	1x tägl. 2 FTA (400 mg) geboostert mit 1 Kps. Norvir oder 2 x tägl. 1 FTA (600 mg) geboostert mit 2 x 1 Kps. Norvir	Zu den Mahlzeiten	RT	• Leberfunktionsstörungen• Kopfschmerz• Durchfall, Übelkeit• Pneumonie
Retrovir®(Zidovudin, AZT)	NRTI	2x tägl. 250 mg (1 Tabl.) oder2x tägl. 300 mg (1 Tabl.)	Einnahme mit Flüssigkeit Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	Übelkeit• Blutbildveränderung• Fettverteilungsstörungen
Reyataz®(Atazanavir, ATV)	PI	1x tägl. 400 mg ungeboostert (2 Tabl. a 200 mg) 1x tägl. 300 mg geboostert mit 100 mg Ritonavir je nach	Zu den Mahlzeiten	RT, trocken	• Gelbfärbung der Haut• Veränderte Herzfrequenz• Verschlechterung von Lebererkrankungen• Verstärkte Blutungen bei Hämophilie



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 5 von 7

		Kombination ist auch Einsatz von 1x tägl. 400 mg geboostert (2 Tabl. a 200mg) möglich			
Rezolsta® (Darunavir, Cobicistat)	PI	1x täglich	Zu den Mahlzeiten	RT	Übelkeit, Magen/Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen, Hautempfindlichkeit
Stribild® (Elvitegravir (EVG) Cobicistat Emtricitabin FTC TenoFour TDF	Integrasehemmer, Booster, NRTI	1x tgl. 1 Tabl.	Zu den Mahlzeiten	RT	Übelkeit Durchfall Niere Leber Blutbild
Stocrin®(Efaviranz, EFV)	NNRTI	1x tägl. 600 mg (1 Kps. a 600 mg)	Einnahme vor dem Schlafengehen 2 h nach dem Essen (generell 2 h Abstand zum Essen)	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Vor allem bei Therapiebeginn: ZNS-Symptome, Schwindel, Schlaftrunkenheit, Alpträume• nach längerer Einnahme: Depressionen! Efaviranz kann zu einem falsch positiven Cannabis-Nachweis führen!
Telzir®(Fosamprenavir, FPV)	PI	2x tägl. 1 Tabl. (700 mg) geboostert mit 2 x tägl. 1 Kps. RTV (100 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausschlag• Diabetes/Hyperglykämie• erhöhte Blutungsneigung von Hämophiliepatienten• Verschlechterung von Lebererkrankungen• Verändertes Blutbild• Fettverteilungsstörungen• Magen-Darm-Beschwerden
Tivicay® (Dolutegravir)	Integrase Hemmer (INI)	1x tägl. 1 Tablette	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	Überempfindlichkeit Magen/Darm, Kopfschmerzen.



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 6 von 7

					Schlafstörungen
Triumeq (Dolutegravir, Abacavir, Lamivudin)	INI NRTI	1x tägl. 1 Tablette	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	Überempfindlichkeit Magen/Darm, Kopfschmerzen, Schlafstörungen
Trizivir®(Zidovudin, AZT + Lamivudin, 3TC + Abacavir, ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg ATZ + 150 mg 3TC + 300 mg ABC)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	Siehe Epivir®, Retrovir®, Ziagen®
Truvada®(Tenofovir, TDF + Emtricitabin, FTC)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (300 mg TDF + 200 mg FTC)	Zu den Mahlzeiten	RT	Magen-Darm-Beschwerden• Muskelbeschwerden (CAVE: Laktatazidose)• Schwindel
Videx®(Didanosin, ddl)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps.(250 mg < 60 kg bzw. 400 mg > 60 kg)	Nüchtern 2h vorher und nachher keine Nahrungsaufnahme Einnahme mit Flüssigkeit	RT	• Pankreatitis, Neuropathie• Magen-Darm-Beschwerden• Kopfschmerzen bei Therapiebeginn
Viramune®(Nevirapin, NVP)	NNRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg) oder 1 x tägl. 1 Retardtablette (400mg)	Einnahme mit Flüssigkeit Unabhängig von den Mahlzeiten Therapie einschleichend beginnen: 14 Tage 1 x tägl. 1 Tabl. (200 mg), dann 2 x tägl. 1 Tabl. (200 mg),	RT	Allergische Reaktionen bis Steven- Johnson-Syndrom• Leberwertveränderungen
Viread®(Tenofovir, TDF)	NRTI	1 x tägl. 1 Tabl. (245 mg)	Zu den Mahlzeiten	RT	• Durchfall, Erbrechen, Blähungen• Blutbildveränderungen
Zerit®(Stavudin, d4T)	NRTI	1 x tägl. 1 Kps. (30 mg < 60 kg bzw. 40 mg > 60 kg)	Nüchtern 1 h vor den Mahlzeiten; falls nüchtern nicht möglich, zusammen	RT	• Laktatazidose• Fettverteilungsstörungen• Polyneuropathie



HIV Leitfaden

Stand Mai 2015

Version 2.1
Seite 7 von 7

			mit kleinen, leichten Mahlzeit		
Ziagen®(Abacavir, ABC)	NRTI	2 x tägl. 1 Tabl. (300 mg) oder 1 x tägl. 2 Tabl. (600 mg)	Unabhängig von den Mahlzeiten	RT	<ul style="list-style-type: none"> • Übelkeit, Kopfschmerzen• bei ca. 5% „ABC-Überempfindlichkeitssyndrom“, tritt meistens innerhalb der ersten vier Wochen auf: Fieber, Hautausschlag; Übelkeit, Leberwertveränderung, bei Reexposition lebensbedrohliche allergische Reaktion!